

Nom : ..... Prénom : ..... Service : .....	<b>EVALUATION COMPORTEMENTALE DE LA DOULEUR          CHEZ LA PERSONNE AGEE          Echelle Doloplus-2®</b>
--	---

<b>OBSERVATION COMPORTEMENTALE</b>		<b>Dates</b>			
<b>RETENTISSEMENT SOMATIQUE</b>					
1. Plaintes somatiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de plainte.....</li> <li>• Plaintes uniquement à la sollicitation .....</li> <li>• Plaintes spontanées occasionnelles .....</li> <li>• Plaintes spontanées continues .....</li> </ul>	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
2. Positions antalgiques au repos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de position antalgique .....</li> <li>• Le sujet évite certaines positions de façon occasionnelle.....</li> <li>• Position antalgique permanente et efficace .....</li> <li>• Position antalgique permanente inefficace .....</li> </ul>	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
3. Protection des zones douloureuses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de protection .....</li> <li>• Protection à la sollicitation n'empêchant pas la poursuite de l'examen ou des soins.....</li> <li>• Protection à la sollicitation empêchant tout examen ou les soins .....</li> <li>• Protection au repos, en l'absence de toute sollicitation ..</li> </ul>	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
4. Mimique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mimique habituelle .....</li> <li>• Mimique semblant exprimer la douleur à la sollicitation..</li> <li>• Mimique semblant exprimer la douleur en l'absence de toute sollicitation.....</li> <li>• Mimique inexpressive en permanence et de manière inhabituelle .....</li> </ul>	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
5. Sommeil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommeil habituel.....</li> <li>• Difficultés d'endormissement .....</li> <li>• Réveils fréquents (agitation motrice).....</li> <li>• Insomnie avec retentissement sur les phases d'éveil.....</li> </ul>	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3

(suite)

Nom : .....  
 Prénom : .....  
 Service : .....

**EVALUATION COMPORTEMENTALE DE LA DOULEUR  
 CHEZ LA PERSONNE AGÉE  
 Echelle Doloplus-2® (suite)**

<b>OBSERVATION COMPORTEMENTALE</b>		<b>Dates</b>			
<b>RETENTISSEMENT PSYCHO-MOTEUR</b>					
6. Toilette et/ou habillage	• Possibilités habituelles inchangées.....	0	0	0	0
	• Possibilités habituelles peu diminuées (précautionneux mais complet).....	1	1	1	1
	• Possibilités habituelles très diminuées, toilette et/ou habillage étant difficiles et partiels .....	2	2	2	2
	• Toilette et/ou habillage impossibles, le malade exprimant son opposition à toute tentative .....	3	3	3	3
7. Mouvements	• Possibilités habituelles inchangées.....	0	0	0	0
	• Possibilités habituelles actives limitées (le malade évite certains mouvements, diminue son périmètre de marche, ...).....	1	1	1	1
	• Possibilités habituelles actives et passives limitées (même aidé, le malade évite ses mouvements) .....	2	2	2	2
	• Mouvements impossibles, toute mobilisation entraînant une opposition .....	3	3	3	3
<b>RETENTISSEMENT PSYCHO-SOCIAL</b>					
8. Communication	• Inchangée.....	0	0	0	0
	• Intensifiée (la personne attire l'attention de manière inhabituelle).....	1	1	1	1
	• Diminuée (la personne s'isole).....	2	2	2	2
	• Absence ou refus de toute communication .....	3	3	3	3
9. Vie sociale	• Participation habituelle aux différentes activités (repas, animations, ateliers thérapeutiques) .....	0	0	0	0
	• Participation aux différentes activités uniquement à la sollicitation.....	1	1	1	1
	• Refus partiel de participation aux différentes activités....	2	2	2	2
	• Refus de toute vie sociale .....	3	3	3	3
10. Troubles du comportement	• Comportement habituel.....	0	0	0	0
	• Troubles du comportement à la sollicitation itératifs .....	1	1	1	1
	• Troubles du comportement à la sollicitation permanents	2	2	2	2
	• Troubles du comportement permanents (en dehors de toute sollicitation).....	3	3	3	3
Copyright		<b>SCORE</b>			